

Toppkapingar

Avslöjas ofta av en plötslig förändring av stamjockleken och/eller en stor mängd adventiva skott. Röta utvecklas nästan alltid, men är ofta dold av den kraftiga återväxten.

Grensår

I såret efter en avbruten gren utbildas någon gång röta. Detta gäller speciellt om fläkningsskador uppstått i samband med att den gått av. Var uppmärksam på om övervalningen är dålig. Gör aldrig mekaniska ingrepp i en hålighet eller rötcolunn. Vid försök att rensa ut eller dränera en hålighet - s k trädkirurgi - löper man alltid risken att skada trädets eget försvar, vilket leder till att rötan får ytterligare spridning.

Svag stamfördelingspunkt

Dubbelstammar med brant vinkel, har alltid låg hållfasthet i förgreningen. Detta gäller även branta grenvinklar. Hall utvik efter begynnande sprickor, då rötangreppen ofta börjar där.

Beskärningsskador

I såret efter en gammal beskärning kan det utvecklas röta som ofta döjs av fang eller dyl. Var speciellt uppmärksam på så kallade flush cut.

Lösa barkstycken


Stora stycken av lös bark kan ofta döja död eller ruttan ved. Ta bort lös bark och undersök om där finns rötangrepp.

Håligheter vid stambasen

Dessa är speciellt riskabla om de uppträder mellan flera rotben samtidigt.

Rotskador

Packningsskador efter byggetablering och dåliga markförhållande i största allmänhet, kan resultera i ett skadat och dåligt utvecklat rötstycken.



Negativa förändringar i krona och bladverk

Stor mängd döda grenar i kronan, dålig årsstillväxt och gles krona kan vara tecken på att trädet har problem att ta upp vatten eller näring. Detta kommer också till uttryck genom att lövsätningen är sparsam, bladen är små eller bleka. Skador i stam eller röt-system kan i vissa fall ta sig uttryck i onormalt riklig blomning. Slutligen bör man vara uppmärksam på en alltför tidig lövfällning. Om bladen har bruna kanter redan i början på augusti är detta ofta tecken på saltskador.

Lövrädskräfta

Angrepp av lövrädskräfta kan resultera i en försvagning av grenens eller stammens mekaniska hållfasthet.

Plötslig förändring av grenriktning

Dessa är resultat av tidigare beskärningsåtgärder. Här kan rötangrepp döja sig.

Synliga fruktkroppar av svamp

Förekomsten av svamp (tickor) på stammen är vanligen en säker indikation på intern röta. Fruktkropparna från svamp på eller i kring rötterna kan vara en indikation på röta, men dessa svampar är ofta ofarliga eller till och med nyttiga.

Sprickor i markytan

Ett dåligt förankrat rötssystem kan ibland orsaka så kraftiga rörelser i jorden att sprickor kommer till synes i markytan.